

SCHÄTZEN SIE IHR RISIKO EIN

Der Fragebogen soll Ihnen bei der Einschätzung helfen, ob bei Ihnen ein Risiko für Barrett-Ösophagus oder Kehlkopfkrebs bestehen könnte.

Haben Sie häufig Reflux-Symptome?

Ja Nein

Sind Sie männlich?

Ja Nein

Sind Sie 50 Jahre oder älter?

Ja Nein

Sind Sie übergewichtig?

Ja Nein

Rauchen Sie oder haben Sie geraucht?

Ja Nein

Gibt es in Ihrer Familie Fälle von Barrett-Ösophagus, Magenkrebs oder Kehlkopfkrebs?

Ja Nein

Haben Sie Diabetes?

Ja Nein

Leiden Sie an Schlafapnoe?

Ja Nein

Jede Frage steht für einen Risikofaktor.

Wenn Sie eine der Fragen mit „Ja“ beantwortet haben, sprechen Sie bitte mit Ihrem Gastroenterologen darüber, ob ihre Gesundheit beeinträchtigt sein könnte.

Barrett- Ösophagus ist der primäre Risikofaktor für die Entwicklung von Kehlkopfkrebs. ¹

In der Fachliteratur werden verschiedene Risikofaktoren in Zusammenhang mit dem Fortschreiten der Erkrankung genannt. ¹⁻⁷

Eine frühe Diagnose und Behandlung kann Ihr Risiko signifikant senken. ^{8,9}

Quellen:

1. Spechler S et al. Barrett's Esophagus. N Engl J Med 2014;371:1836-45. 2. Chak A, Lee T, Kinnard MF, et al. Familial aggregation of Barrett's oesophagus, oesophageal adenocarcinoma, and oesophagogastric junctional adenocarcinoma in Caucasian adults. Gut. 2002 Sep;51(3):323-8. 3. de Jonge PJ, van Blankenstein M, Looman CW, et al. Risk of malignant progression in patients with Barrett's oesophagus: a Dutch nationwide cohort study. Gut. 2010 Aug;59(8):1030-6. 4. Anaparthi R, Gaddam S, Kanakadandi V, et al. Association Between Length of Barrett's Esophagus and Risk of High-Grade Dysplasia or Adenocarcinoma in Patients Without Dysplasia. Clin Gastroenterol Hepatol. 2013 Nov;11(11):1430-6. 5. Pohl H, Wrobel K, Bojarski C, et al. Risk factors in the development of esophageal adenocarcinoma. Am J Gastroenterol. 2013 Feb;108(2):200-7. 6. Sikkema M, Looman CW, Steyerberg EW, et al. Predictors for neoplastic progression in patients with Barrett's Esophagus: a prospective cohort study. Am J Gastroenterol. 2011 Jul;106(7):1231-8. 7. de Jonge PJ, Steyerberg EW, Kuipers E J, et al. Risk factors for the development of esophageal adenocarcinoma in Barrett's esophagus. Am J Gastroenterol. 2006 Jul;101(7):1421-9. 8. Phoa KN, van Vilsteren FG, Pouw RE, et al. Radiofrequency Ablation in Barrett's esophagus with Confirmed Low-Grade Dysplasia: Interim Results of a European Multicenter Randomized Controlled Trial (SURF). Gastroenterology 2013;144:S-187. 9. Shaheen NJ, Sharma P, Overholt BF, et al. Radiofrequency ablation in Barrett's esophagus with dysplasia. N Engl J Med 2009;360:2277-88. Page 2277.